

Kuutar CL^{BOR} -rypsi

Herbisidin kestävä uutuus Clearfield-viljelyyn

Kuutar CL on uusi rypsilajike Clearfield®-viljelyyn (CL). BASFin kehittämässä Clearfield®-viljelymenetelmässä myös leveälehtiset rikkakasvit voidaan torjua ilman, että siitä aiheutuu haittaa viljelykasville. Kuutar CL on rypsiksi aikainen ja se soveltuu viljelyyn koko rypsinviljelyalueelle.

Kasvuaika

Kuutar CL on aikainen rypsi, se tulee tulla pari päivää aikaisemmin kuin esim. Synthia. Se soveltuu viljeltäväksi koko rypsinviljelyalueelle vyöhykkeille I-IV.

Sato

Sadoltaan Kuutar CL on 11 %:n parannus Aurea CL -rypsiin. CL-rypsien sato ei kuitenkaan yllä tavanomaisten rypsiens tasolle. Sen etu onkin nimenomaan siinä, että sitä voi viljellä pelloilla, joilla on rikkakasviongelmaa. Kuutaren Aurea parempi satopotentiaali perustuu siihen, että se on synteettinen hybridilajike muiden nykyajikkeidemme tapaan.

Käyttötarkoitus

Kuutar CL sopii elintarvikekäyttöön ja sen puristerouhe eläinten valkuaisrehuksi. Kuutaren öljypitoisuus on hieman korkeampi kuin Aurealla. Aikaisuus lisää sen viljelyvarmuutta, mistä on osoituksena lajikkeen alhainen lehtivihreäpitoisuus.

Laonkestävyys

Kuutar CL on lyhytvartinen rypsi. Sen korrenlujuus on samanlainen kuin Aurealla, ei niin hyvä kuin Synthialla.

Taudinkestävyys

Oikea viljelykierto on öljykasvien yleisimpien tautien, pahkahomeen ja möhöjuuren, ehkäisyssä erittäin tärkeää. Suomessa suositellaan pidettäväksi samalla lohkolle taukoa öljykasvien viljelystä 4-5 vuotta. Pahkahomeen välttämiseksi väli vuosia on pidettävä myös muista pahkahomeen isäntäkasveista, joita ovat mm. kumina, herne, härkäpapu, peruna ja apilat. Pahkahomeen torjuntaruiskutus on suositeltavaa tehdä, jos kukintaa edeltävän kolmen viikon aikana sataa runsaasti, kasvusto on hyvin tiheä tai pahkahomesaastuntoja on ollut alueella aikaisemmin.

Viljelysuositus

Kuutar CL:ää suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV siellä, missä rikkakasvit ovat ongelma. Rypsiä ei kuitenkaan suositella viljeltäväksi kaikkien poudanarimmilla lohkoilla. Hyvin multavilla ja hiekkavilla mailla taimettuminen on tasaisempaa. Öljykasvit kannattaa kylvää peitattuna. Rypsit kylvetään 1 cm syvyyteen.

Clearfield®-viljelymenetelmä

Rypsin viljelyssä ongelmana voivat olla leveälehtiset

rikkakasvit, joita on vaikea torjua viljelykasvin kärsimättä. BASFin Clearfield®-menetelmä on kehitetty tähän tarpeeseen.

Kuutar CL kasvuston rikkakasvit voidaan torjua 8-lehtiaasteelle saakka käyttäen BASFin Clentiga-herbisidiä. Cletigaa ei voi käyttää muille kuin Clearfield®-lajikkeille. Kestävyys herbisidille perustuu yhteen geeniin, joka on tuotu lajikkeeseen perinteisesti risteyttämällä. Tavalliset rypsit eivät näitä herbisidejä kestä.

Perehdy tarkoin Clearfield®-menetelmään ennen Kuutar CL -lajikkeen ostamista. Clearfield®-menetelmää ei voi samalla pelloilla useammin kuin kolmen vuoden välein. CL rypsin jälkeen suositeltavia viljelykasveja ovat syys- ja kevätvehnä, ohra, ruis ja herne.

Alkuperä

Linjanumero: HY 1301 CL
Kasvilajikeluettelo: 2022

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja
Tarja Niemelä
puh. 050 3005050
tarja.niemela@boreal.fi

BOREAL

