


Sinuhe^{BOR} -rypsi

Öljypitoinen satoloikkaaja

Aikainen synteettinen kevätrypsilajike, jonka sato ja laatu lähestyvät rapseja. Sama hyvä viljelyvarmuus, mutta korkeampi öljypitoisuus kuin ensimmäisillä uuden sukupolven rypseillä.



Kasvuaika

Sinuhe on aikainen synteettinen kevätrypsilajike, joka on kasvuajaltaan samaa luokkaa virallisten lajikekokeiden mittarilajike Synthian kanssa. Sinuhe sopii viljelyyn Suomen koko öljykasvientuotantoalueella vyöhykkeillä I-IV.

Sato

Sinuhe on erittäin satoisa lajike. Suomen virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019 - 2020 se oli kokeiden satoisin kevätrypsi. Sinuhen sato oli Synt-hiaa 6 % korkeampi.

Käyttötarkoitus

Sinuhen laatu on erinomainen. Sen öljypitoisuus on ollut virallisissa lajikekokeissa rypsikokeiden korkein ja öljysato suurin. Sinuhen aikaisuus lisää sen viljelyvarmuutta, mistä on osoituksena lajikkeen alhainen lehtivihreäpitoisuus. Sinuhe soveltuu erinomaisesti kasviöljyteollisuuden käyttöön.

Laonkestävyys

Sinuhen varsi on hiukan Synt-hiaa pidempi eikä aivan yhtä luja. Laonkestävyydeltään Sinuhe on kuitenkin nykylajikkeiden keskitasoa ja samaa luokkaa SW Petitan kanssa. Sinuhe on esimerkiksi Corde-liaa lujavartisempi.

Taudinkestävyys

Oikea viljelykierto on öljykasvien yleisimpien tautien, pahkahomeen ja möhöjuuren, ehkäisyssä erittäin tärkeää. Sinuhella ei ole erityistä kestävyttä kumpaakaan tautia vastaan, joten lohkolle on suositeltavaa pitää taukoa öljykasvien viljelystä 4-5 vuotta ennen seuraavaa kylvöä. Pahkahomeen välttämiseksi väli-vuosia on muistettava pitää myös muista pahkahomeen isäntäkasveista, joita ovat mm. kumina, herne, härkä-papu, peruna ja apilat. Pahkahomeen torjuntaruiskutus on suositeltavaa tehdä, jos kukintaa edeltävän kolmen viikon aikana sataa runsaasti, kasvusto on hyvin tiheä tai pahkahomesaastuntoja on ollut alueella aikaisemmin.

Viljelysuositus

Sinuhea suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV. Sinuhe menestyy kaikilla maalajeilla. Sitä ei kuitenkaan suositella viljeltäväksi kaikkein poudanarimilla lohkoilla. Kylvötiheys-suositus on 1 yksikkö hehtaarille eli 6-7 kg yksikkökoosta riippuen. Hyvin multavilla ja hikevillä mailla taimettuminen on tasaisempaa ja laakoontuminen todennäköisempää, joten kylvötiheyttä voi pienentää.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 15328
Kasvilajikeluettelon: 2022

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja
Elina Nissilä
puh.050 562 2908
elina.nissila@boreal.fi

BOREAL